

警告：切勿侵犯版權

閣下將瀏覽的文章 / 內容 / 資料的版權持有者為消費者委員會。除作個人非商業用途外，閣下不得以任何形式傳送、轉載、複製或使用該文章 / 內容 / 資料，如有侵犯版權，消費者委員會必定嚴加追究法律責任，索償一切損失及法律費用。

精明用藥系列

跟足藥物標籤指示服用 以免損害健康

病人在醫院或診所經醫生診斷後，可能從醫院或診所配取藥物，又或需攜處方往社區藥房自行配藥。藥物可以治療疾病，但亦可能有不良的副作用；不適當地使用藥物可導致健康嚴重受損。因此，病人必須認識藥物的效用，及按照醫生或藥劑師指示使用藥物。這些指示及一些有關處方的資料會由醫生或藥劑師清楚列明在配發藥物的標籤，並將該標籤附在藥物包裝上。是次邀請藥劑師為大家解說配發藥物標籤的常見資料。

配發藥物標籤

在本港出售的註冊藥物其外包裝或包裝附頁會列明該藥物的詳細資料，如效用、副作用、使用該藥物的禁忌及香港的藥物註冊編號等。此外，醫生或藥劑師會加上配發藥物標籤，內容包括以下資料：

- 病人姓名
- 藥物名稱（最好為藥物學名）
- 藥物劑量
- 用量及用法
- 服藥時應注意的事項
- 配藥日期
- 醫生或藥房的資料

病人姓名

藥物標籤上會列出病人的姓名。病人取得藥物後，應仔細核對配發藥物標籤上的資料，以免有誤。

藥物名稱

病人可留意標籤上的藥物名稱，以便有需要時跟醫護人員溝通。標籤上清楚標示藥物的正確名稱，可讓需要跟進病情的醫護人員知道病人曾服用過什麼藥物。

藥物的劑量

標籤上亦會標示藥物的劑量，即每個

每日 2 次，每隔 8 小時
每次 1 粒
飯後服
特效抗生素 請服完療程

(藥丸)

服用抗生素類藥物，必須服完整個療程，而所配發藥物的標籤應如上圖般提醒病人：下圖所示的藥物同為抗生素，卻沒有類似提示，不夠理想。

每日服 3 次，每次服 1 粒
After meal 飯後服 ☒ No alcohol 忌酒
Drug 藥名：Amoxycillin 250mg消炎

單位的藥物含量。因為藥物劑型的不同，表達方式也有不同，常見的標示有每粒含X毫克藥物、每毫升含X毫克藥物等。

藥物的用量及用法

藥物的用量或劑型會按照病人的年齡、體重、體質等因素而調節。不同的藥物亦有不同的用法，如外用或內服等。用藥量不準確或用法不當不但可能影響治療效果，甚至可能對病者構成危險。因此，用藥時必須小心依據配發藥物標籤上的指示使用，並以標準藥匙、口服針筒或量藥管，量度所需的用量。如有任何不明白的地方，須向醫生或藥劑師查詢，切勿擅自停藥、增減用藥量或改變用法。

注意事項

此外，不同藥物有其特性，例如是否飽肚或空腹時服用會影響某些藥物的藥效，故此，病人應留意配發藥物標籤上的提

示。常見的例子如下：

- 臨用前搖勻
- 咬碎後吞服
- 餐前半至1小時或空肚服
- 飽肚或與食物同服
- 不宜與牛奶、胃藥或含鐵質藥物同服
- 服此藥期間忌喝酒
- 此藥可使人昏昏欲睡，服後如有此情形，不得駕駛或動用機械
- 必須服完整個療程
- 此藥須存放於雪櫃內，但勿置於冰格

醫生診所或配藥藥房的名稱、地址等，方便在有需要時，追溯藥物的來源。

配藥須知

根據《藥劑業及毒藥條例》，處方藥物只可在有「R」標誌的藥房由藥劑師核實處方後配售藥物。病人應向藥劑師詳細瞭解藥物的用法及用量，如對配發的藥物有任何疑問，應即時查詢。




配藥地點的資料及配藥日期

配發藥物標籤上會標示配藥日期、

藥物的註冊編號

此外，本港法例規定，香港境內銷



▲在香港註冊的藥物，會獲發一個由「HK-」及一個五位數字組成的註冊編號。

售的藥物必須註冊。藥物經註冊後會獲發一個由「HK-」及一個五位數字組成（如HK-XXXXX）的註冊編號。這個編號須標示在藥物的外包裝上。市民購買時應留意藥物的外包裝是否印有註冊編號。所有註冊藥物的資料，如藥物的註冊編號、商品名稱及其成分學名等已列載在衛生署藥劑事務部的網頁（<http://www.psdh.gov.hk/>）。

標示不常用名稱增加延誤救治的風險

附圖是一瓶處方給一位小孩服用的藥物，此藥物頗常用，但你閱讀藥物標籤上的藥名，能即時知道是什麼藥嗎？

其實4-hydroxyacetanilide是止痛退燒藥「撲熱息痛」（Paracetamol）的化學名稱。該小孩服用該瓶藥水數次後，出現昏迷的情況，家人於是將他送往醫院求診。由於標籤上的化學名稱不常用，醫護人員需花時間查閱藥典才能確定藥物的屬性。藥劑師以小孩的年齡計算所需的劑量後，發現標籤上所列的劑量過大，認為小孩已中毒，須使用解藥治療。由於標示的藥物名稱不常用，增加了翻查的時間，令小孩錯過了最佳時機才服用解藥，引致肝臟受損。


自行購買藥物

消費者欲自行購買非處方藥物必須細閱藥物包裝及包裝附頁上的資料，以瞭解該藥物的劑量、用量、用法、應注意的事項及副作用等。如有需要，應諮詢社區藥劑師的意見。

香港醫院藥劑師學會意見

藥物可以三個名稱辨認，分別是「學名」（generic name）、「商品名稱」（brand name）和化學結構名稱「化學名稱」（chemical name）。藥物學名為醫護人員之間通用的名稱，使用學名可避免病人服用相同的藥物，亦方便日後有服藥問題需跟進時，較易斷定實際藥物的名稱。除非是組合式藥物，否則應盡量使用學名作標籤，以免妨礙藥物辨識。此外，由於藥物可能會有多个化學名稱，而化學名稱亦極少使用，以化學名稱標示的藥物須花較多時間翻查專門藥典才能確定其性質，為方便跟進，最好在配發藥物標籤上使用學名。

資料來源：香港醫院藥劑師學會
藥物教育資源中心



註冊藥物名錄 (只限英文版本)				
藥品名稱	註冊號碼	主要成份	公司名稱	公司地址
74. BROMHEXINE TAB 8MG	HK20396	BROMHEXINE	PHARM LTD	CTR, 2-12 AU PUI WAN ST, FO TAN, NT
75. BROMHEXINE TAB 8MG	HK09565	BROMHEXINE	PHARMACEUTICAL CO LTD	FORTUNE FTY BLDG 40 LEE CHUNG ST, CHAI WAN, HK
76. BROMHEXINE TAB 8MG	HK23701	BROMHEXINE	PHARM LAB LTD	19-21 KUNG YIP ST, KWAI CHUNG, NT
77. BROMHEXINE TAB 8MG	HK44421	BROMHEXINE	HEALTH PRODUCTS CO LTD	CTR, YIP SHING ST KWAI CHUNG, NT
78. BROMHEXINE TAB 8MG	HK20057	BROMHEXINE	LAB LTD	CHINA TRADE CTR 122-124 WAI YIP ST, KWUN TONG, KLN
79. BROMHEXINE TAB 8MG	HK19388	BROMHEXINE	LAB LTD	

▲衛生署藥劑事務部的網頁載有香港註冊藥物的資料（<http://www.psdh.gov.hk/>）。